

Presentation:

Radisil™ 140mg Capsule: Each capsule contains standardized extract of Milk thistle 175mg equivalent to Silymarin 140mg.

Description:

Silymarin, a flavonoid complex of *Silybum marianum* or Milk thistle, is the biologically active component. It provides hepatocellular protection through toxin blockade at the membrane level, enhances protein synthesis, antioxidant activity, anti-fibrotic activity and possible anti-inflammatory or immunomodulating effects.

Indications & Uses:

Radisil™ is indicated for the treatment and prevention of-

- Liver disease, (non-alcoholic & alcoholic)
- Liver cirrhosis, (non-alcoholic & alcoholic)
- Infectious hepatitis
- Drug-induced hepatitis
- Liver disease secondary to diabetes mellitus
- Toxicity of narcotics
- Fatty liver
- Jaundice

Dosage & Administration:

1 capsule 2 to 3 times daily or as directed by physician.

Contraindications:

Contraindicated in patient with a known hypersensitivity to silymarin.

Pregnancy & Lactation:

No known restrictions.

Side Effects:

Well tolerated in recommended dose. Occasionally a mild laxative effect may observe .

Drug Interactions:

Concomitant use of silymarin and butyrophenones or phenothiazines has resulted in the reduction of lipid peroxidation.

Pharmaceutical Precautions:

Store in a cool & dry place, away from light & moisture.

Keep out of reach of children.

Packs:

Radisil™ 140mg Capsule: Each box contains 50 capsules in Alu-PVC/PVDC blister pack.

TM: Trade Mark



উপস্থাপনাঃ

রেডিসিল™ ১৪০মিগ্রা ক্যাপসুলস প্রতিটি ক্যাপসুলে রয়েছে ১৭৫মিগ্রা মিল্ক হিস্ল স্ট্যাভার্ডাইজ্ড নির্যাস যা ১৪০মিগ্রা সিলিমারিন এর সমতূল্য।

বিবরণঃ

সিলিমারিন, সিলিবাম মেরিয়ানাম বা মিল্ক থিসল এর একটি ফ্ল্যান্ডেল কমপ্লেক্স যা বায়োলজিকালি কার্যকর উপাদান। এটি কোষবিন্দিতে টক্সিন এর প্রবেশে বাধাদান, প্রোটিন সংশ্লেষণ বৃদ্ধি, এস্টিঅস্কিউলেন্ট কার্যকারিতা, এন্টি-ফাইব্রিয়টিক কার্যকারিতা এবং সংশ্লেষণ প্রদাহরণী অথবা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে লিভারকে সুরক্ষা প্রদান করে।

নির্দেশনা ও ব্যবহারঃ

রেডিসিল™ ক্যাপসুল যে সকল রোগের চিকিৎসায় ও প্রতিরোধে নির্দেশিত-

- যকৃৎ বা লিভারের রোগ, (নন-এলকোহলজনিত, এলকোহলজনিত)
- লিভার সিরোপিস, (নন-এলকোহলজনিত, এলকোহলজনিত)
- সংক্রান্ত যকৃৎ প্রদাহ
- ওষুধ ব্যবহারজনিত যকৃৎ প্রদাহ
- ডায়াবেটিক রোগজনিত যকৃৎ এর রোগ
- মাদক দ্রব্য ব্যবহারজনিত বিষাক্ততা
- ফ্যাটি লিভার
- জড়িস

সেবনমাত্রা ও সেবনবিধিঃ

১টি করে ক্যাপসুল দৈনিক ২-৩ বার সেব্য অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নির্দেশিত।

প্রতিনির্দেশনাঃ

মেসকল রোগীদের সিলিমারিন এর প্রতি অতিসংবেদনশীলতা আছে তাদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

গৰ্ভবত্তায় ও শন্যদানকালে ব্যবহারঃ

কোন সীমাবদ্ধতা জানা যায়নি।

পৰ্যাপ্তিক্রিয়াঃ

নির্দেশিত মাত্রায় সিলিমারিন শরীরের জন্য সহনশীল। কদাচিং মৃদু-বিরেচক ক্রিয়া পরিলক্ষিত হতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে ক্রিয়াঃ

সিলিমারিন এবং বিউটাইরোফেননস্ বা ফেনোথায়াজিন এর সহ-ব্যবহারে লিপিড পারেক্সিডেশন করে যেতে পারে।

ওষুধ বিষয়ক সতর্কতাঃ

আলো ও আর্দ্ধা থেকে দূরে, ঠাণ্ডা ও শুক্র হানে সংরক্ষণ করুন।

সকল ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহঃ

রেডিসিল™ ১৪০মিগ্রা ক্যাপসুলস প্রতিটি বাল্কে রয়েছে ৫০টি ক্যাপসুল অ্যালু-পিভিসি/পিভিডিসি স্লিস্টার প্যাকে।

TM: ট্রেডমার্ক

RADIANT
NUTRACEUTICALS

প্রস্তুতকারক

রেডিসিল নিউট্রাসিউটিক্যালস লিমিটেড (হারবাল ডিভিশন)

বি-৩৪, বিসিক শিল্প নগরী

টঙ্গী, গাজীপুর, বাংলাদেশ